

Metz ce 19 8bre 1845.

Monieur,

Pardonnez moi si j'ai encore recours à votre obligeance, mais connaissant par expérience combien vous êtes bienveillant pour ceux qui comme moi étudient la science, j'a me repose avec confiance en vous et suis certain que vous voudrez bien continuer à m'aider dans vos hautes lumières dans le travail que j'ai entrepris et que je poursuis avec persévérance.

J'ai eu le malheur d'égarer, parait-il, la note des Dossiers de pieces que je vous avais adressé pour M. votre directeur; je ne sais donc si ceux que je vous indique aujourd'hui, dont je desirais des deux colonnes, en feroient partie; mais quoi qu'il en soit, il sera facile d'en retrancher ceux qui feroient alors double emploi.

Je demande à M. Zahner les deux de grandeur naturelle & entier & haut de couleur. Des pieces

1. variegatus. (Lath. 57)
2. cancellatus. (Wagl.)
3. adspersus. (Nutt.)
4. galatus. (Nutt. (Tamm.)
5. hirsutus. (Nutt.) montrant le dos.
6. melanogaster. (Nutt.)
7. tinunculus. (Wagl.)

à Monieur J. Ratterer

- 8° *querulus* (Wils. ♂ & le jeune)
- 9° *cactorum* (d'Orbigny)
- 10° *Kizuki* (Strobale)
- 11° *moluccensis* (Linn)
- 12° *variegatus* (Wagler) ♂ & le jeune
- 13° *obsoletus* (Wagl.)
- 14° *scalaris* (Licht.)
- 15° *Centurus*...? Donaparte. t. 1. (n° 48 du catalogue que je possède.)
- 16° *nubiceps* (Linn) } montrant le devant et les tiges jaunes
- 17° *notatus* (Licht.) } id des arbes au de la queue
- 18° *punctuligerus* } id
- 19° *neglectus* Gould.
- 20° *chilensis*.
- 21° *goensis* (Linn) laissez voir le dos et le croupion
- 22° *affinis* (Natterer) qui paraît différent de celui de Wagler n° 61 et de Swainson (Zool. Illust. tab. 78.)
- 23° *brasilensis* (Swainson)
- 24° *aerulentus*.
- 25° *Jamana* (Spix) qui paraît différent du *badioides* (Lesson)
- 26° *brachyurus*.
- 27° *flavirigula* (Natt.) (laissez voir le dessus de la tête et la poitrine)
- 28° *melampogon* (Licht.)
- 29° *hemircircus brunneus* (Eyton)
- 30, 31° *nattereri* et *hematostigma*

Permettez moi actuellement quelques questions pour résoudre des doutes sur certaines espèces.

- 1° Le *Spilopterus* ou picus *spilolophus* (Nigors Procéd. vol. 1. p. 98) n'est ce pas l'*hematostigma* (Wagler, syn. n. 95) que l'on serait alors la femelle?
- 2° connaissez vous des synonymes aux pics *cancellatus* (Wagl. isis) et *adsperatus* (Natt.)
- 3° En quelle année le p. *capistratus* (Natt.) a-t-il été nommé ainsi? Le *capistratus* (Licht.) semble un peu à un *Carolinus* et diffère beaucoup de votre par conséquent
- 4° Le pic que vous avez nommé p. *fenestratus* et que j'ai revu de suite à mon retour d'Allemagne me paraît le picus *Grayi*; seulement le dessin de M. Zehner, me laisse quelque doute, par la

position de l'oiseau qui est retourné de côté, l'art de savoir jusqu'où descend le noir devant la ligne blanche du cou et sur la poitrine, ainsi que la ligne blanche de côté, voici le devant de mon picus *Grayi*; ayez la bonté de me dire si votre *fenestratus* est pareil pour le noir et le blanc. Dans le dessin reçu de Vienne, le noir ne descend que jusqu'à la ligne punctuée, et le blanc s'arrête à un pouce au dessus du poignet de l'aile. Je soupçonne que c'est le même oiseau, en ayant déjà reçu plusieurs de St. Jé de Bogota semblables à mon p. *Grayi*, ci-contre le mâle.



p. *Grayi* ♂.

Je dois vous avouer qu'on m'en a fait du pic que j'avais nommé à Vienne p. *nattereri* j'ai reconnu que c'était le p. *icteromelas*, (Virella nouv. Dict. d'hist. nat. vol. 26 p. 84, du Brésil) et Wagler syst. n° 43. Les exemplaires que j'ai vus à Londres diffèrent du mien que vous m'avez donné, par un peu plus de jaune clair dans l'*icteromelas*, mais je suis très disposé à les confondre en une seule et même espèce.

Je presume que dans ma dernière lettre j'ai demandé à M. Zehner les dessins de p. *Nattereri* et p. *hematostigma*; et je l'ai oublié je le prie de les ajouter à ceux ci dessus.

Vous avez des p. *hematostigma* n'ayant pas de bande verdâtre sur le côté de la joue; mais du reste entièrement semblables aux autres. Serait-ce un jeune? ou une femelle?

Je vous envoie enfin, Monieur, recouru à votre savante entremise pour obtenir les mesures suivantes de vos espèces:

<i>scintilla</i> (Natt.)	1° mesure du bec à partir de l'angle de l'ouverture du bec jusqu'à la pointe du bec.
<i>olivinus</i> (id)	
<i>musinus</i> (id)	2° de l'extrémité des ailes plées à l'extrémité de la queue, ou bien de la portion de queue excédant les ailes au repos.
<i>affinis</i> (Natt.)	
<i>leucolemus</i> (Natt.)	
<i>grammicus</i> (Natt.)	
<i>capistratus</i> (Natt.)	

Plus pour les 4 espèces ci après
Savoir p. adspersus (Nutt.)
 assinilis (Nutt.)
 fronatus (Nutt.)
 melanogaster (Nutt.)

- 1° La longueur totale de l'oiseau
- 2° id — du bec depuis l'ouverture, jusqu'à l'extrémité
- 3° id du bec depuis le front seulement,
- 4° id de l'aile
- 5° De la queue
- 6° de la portion de queue excédant les ailes
- 7° De la tarse.

J'écris à M. Paris et je le prie de vous en informer
auprès de vous et de M. Johnes lorsque tous
les dessins seront terminés; alors il aura
la bonté de m'en faire un envoi complet
auquel je vous serai obligé de joindre vos
précieux renseignements; et en me faisant
connaître ce que je devrai à M. Johnes
je m'empresserai de le lui adresser par
la poste.

Mon dernier voyage à Londres cet été, m'a
procuré l'étude d'un grand nombre de plumes
et autres oiseaux de l'Himalaya que M.
Hodson a rapportés et qui sont fort beaux.
Soyez eny bon, Monsieur pour apprécier toute
mes vives et empressées à l'honorable Monsieur
Fitzinger et agréer pour vous même
avec mes excuses pour l'embarras que
j'ai encore vous donner l'expression
vide de mes sentiments de très haute
considération et dévouement

Votre affectueux serviteur
Alfred Malherbes